

actim® PROM – test do wykrywania pęknięcia błon płodowych

Do czego służy test PROM?

Test actim® PROM jest szybkim testem diagnostycznym służącym do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM). Actim® PROM znacznie przewyższa dawniej stosowane metody, które opierały się na badaniu pH. Test actim® PROM jest europejskim „złotym standardem” nieinwazyjnej diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.

Działanie testu opiera się na immunologicznej detekcji IGFBP-1 w wymazie z pochwy.

Co to jest IGFBP-1?

IGFBP-1 (białko łączące typu 1 insulinopodobnego czynnika wzrostu) występuje w bardzo wysokim stężeniu w płynie owodniowym. Stężenie IGFBP-1 w płynie owodniowym 100-1000 -krotnie przewyższa stężenie IGFBP-1 w osoczu krwi. Wykrycie IGFBP-1 w wydzielinie z pochwy jednoznacznie wskazuje na sączenie płynu owodniowego.

Dokładny i łatwy do wykonania test na sączenie płynu owodniowego

Actim® PROM jest wysoko specyficzną i czułą metodą wykrywania pękniętych błon płodowych. Test jest tak czuły, że może wykryć nawet mniej niż mikrolitr płynu owodniowego. Może być używany we wczesnych stadiach ciąży, już od 15-tego tygodnia. Inne ważne korzyści z wykonania testu to łatwość użycia (test nie wymaga dodatkowego sprzętu) i krótki czas wykonania.

Szybka diagnoza przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM) ma kluczowe znaczenie

- Prosty test Actim® PROM jest cennym narzędziem w postawieniu dokładnej diagnozy PROM, niezależnie od substancji zanieczyszczających (krew, nasienie itp.).
- Prawidłowe leczenie może być rozpoczęte niezwłocznie.
- Tradycyjne metody wykrywania często dają niedokładne wyniki i są wrażliwe na substancje zanieczyszczające.

Actim® PROM – Rewolucjonizuje monitorowanie ciąży!

- Pierwszy, wiarygodny test do wykrywania PROM
- Szybkie pobieranie próbki z wziernikiem lub bez wziernika
- Wyniki w kilka minut – najszybszy test na rynku
- Optymalna czułość, minimalna ingerencja
- Mocne dowody kliniczne

Jak działa Actim® PROM?

Test wykonuje się poprzez umieszczenie paska testowego w wyekstrachowanej próbce wydzieliny z pochwy lub z szyjki macicy. Próbkę wydzieliny należy pobrać za pomocą wymazówki załączonej do zestawu. Następnie wymazówka jest umieszczana w probówce z roztworem, w którym zanurza się pasek testowy. Po nasączeniu paska testowego należy wyjąć go z probówki i po 5 minutach odczytać wynik.
Zobacz procedurę wykonania:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- testy
- jałowe wymazówki
- probówki z roztworem do ekstrakcji próbek
- instrukcja wykonania
- skrócony graficzny schemat wykonywania