

LumiraDx™ INR Test

Pomiar czasu protrombinowego INR

Testy LumiraDx INR są przeznaczone do ilościowego pomiaru czasu protrombinowego (INR) za pomocą platformy LumiraDx.

Współczynnik INR służy do standaryzowanego pomiaru szybkości krzepnięcia krwi. Jest obliczany na podstawie pomiaru ilościowego czasu protrombinowego (PT) w krwi kapilarnej. Niski współczynnik INR może wskazywać na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi, podczas gdy wysoki współczynnik INR może wskazywać na zwiększone ryzyko nadmiernego krwawienia. Poziom INR sprawdza się często w celu monitorowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego z użyciem leków będących antagonistą witaminy K (VKA).

Zalety stosowania testu LumiraDx INR:

- Większa wygoda – badanie w miejscu pobrania/punkcie opieki
- Szybszy czas realizacji w porównaniu z badaniami laboratoryjnymi
- Szybka diagnoza i zarządzanie leczeniem prowadzące do poprawy wyników klinicznych
- Zmniejszona liczba skierowań – zmniejszenie obciążenia dla opieki wtórnej
- Precyzja i dokładność – CV <5% i korelacja z laboratoryjną metodą referencyjną Laboratory ACL Elite
- Przechowywanie testów w temperaturze pokojowej

Test LumiraDx INR wykorzystuje świeżą krew kapilarną. Jest on przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów.

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania z urządzeniem LumiraDx Instrument. Do diagnostyki in vitro.

Zawartość opakowania z testami:

• Paski Testowe pakowane oddzielnie w woreczki aluminiowe/foliowe z pochłaniaczem wilgoci
• Ulotka informacyjna produktu
• Znacznik RFID (Radio Frequency ID, identyfikator radiowy) wbudowany wewnątrz opakowania z testami
• Ulotka informacyjna

Materiały wymagane, ale niedostarczane w opakowaniu z testami:

• Urządzenie LumiraDx Instrument
• Standardowy sprzęt do pobierania krwi (nakłuwacze, gaziki, pojemniki na odpady biologiczne)